
ALICE pp $\sqrt{s}$ = 5 TeV
r_0 = 1.13 ± 0.02 $^{+0.17}_{-0.15}$ fm
λ = 0.68 ± 0.07
ALICE pp $\sqrt{s}$ = 7 TeV
r_0 = 1.13 ± 0.02 $^{+0.17}_{-0.15}$ fm
λ = 0.76 ± 0.08
ALICE pp $\sqrt{s}$ = 13 TeV
r_0 = 1.18 ± 0.01 ± 0.12 fm
λ = 0.64 ± 0.06
ALICE pp
r_0 = 1.15 ± 0.02 $^{+0.14}_{-0.15}$ fm
λ = 0.68 ± 0.07
K⁻p ⊕ K⁻p̄
Coulomb
Coulomb+Strong (Kyoto Model)
Coulomb+Strong (Jülich Model)
0.7 < S_T < 1
$C(k^*)$
k^* (MeV/c)
n-σ$_{stat}$
χ^2/NDF = 29.70
χ^2/NDF = 15.59
χ^2/NDF = 32.82
χ^2/NDF = 6.29
χ^2/NDF = 10.54
χ^2/NDF = 5.39
χ^2/NDF = 13.21
χ^2/NDF = 2.51
χ^2/NDF = 6.75
χ^2/NDF = 6.21
χ^2/NDF = 12.07
χ^2/NDF = 35.85